

Gebrauchsinformation

pantogar®

Kapseln

Z.Nr. 1-18177

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
D-60318 Frankfurt

Zulassungsinhaber:

Merz Consumer Care Austria GmbH,
1110 Wien, Guglgasse 17

Zusammensetzung

1 Kapsel enthält: Calcium-D-pantothenat 60 mg,
L-Cystin 220 mg.

Hilfsstoffe:

Cellulose, Farbstoffe (E171, E172), Gelatine,
Magnesiumstearat, Povidon, Siliciumdioxid, Talc.

Eigenschaften und Wirksamkeit

Pantogar ist ein Haar- und Nageltherapeutikum zum Einnehmen. Pantogar versorgt die Haare und Nägel über die Blutbahn mit den Aufbaustoffen Calcium-D-pantothenat und der Aminosäure L-Cystin. Pantogar zeigt eine günstige Wirkung bei verschiedenen Formen des diffusen Haarausfalls. Sowohl anhand der Anzahl spontan ausgefallener Haare als auch der Haarwurzeluntersuchung kann eine Haarwachstumsverbesserung beobachtet werden. Pantogar bewirkt eine Verbesserung der Haarstruktur, eine Erhöhung der Widerstandskraft des Haares gegenüber mechanischen, chemischen sowie Strahlenschäden und eine Stärkung der Haare. Nagelwachstumsstörungen erfahren durch die Pantogar-Behandlung eine starke Besserung. Die Brüchigkeit der Nägel nimmt ab, und die Elastizität nimmt zu.

Anwendungsgebiete

Diffuser Haarausfall (Haarausfall unklärbarer Ursache). Degenerative Veränderungen der Haarstruktur (strapaziertes, dünnes, unelastisches, sprödes, brüchiges, schlaffes, glanz- und farbloses Haar), durch Sonnen- und UV-Bestrahlung geschädigtes Haar, Vorbeugung gegen Ergrauen des Haares. Nagelwachstumsstörungen (brüchige, splitternde und unelastische Nägel).

Art der Anwendung

Zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten: Erwachsene 3x täglich 1 Kapsel. Mittlere Behandlungsdauer 3-6 Monate. Die Behandlung kann im Bedarfsfall fortgesetzt oder wiederholt werden.

Gegenanzeigen

Keine.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Einnahme des Präparates während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden.

Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekte

Keine bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Da sich die Haarbildung langsam vollzieht, ist eine regelmäßige Einnahme von Pantogar in der vorgeschriebenen Dosierung über einen Zeitraum von 3-6 Monaten wichtig, um Erfolge bei der Behandlung zu erzielen.

Pantogar ist weder bei narbigem Haarausfall noch bei der androgenetischen oder gewöhnlichen Alopezie (männliche Glatze) angezeigt. Pantogar kann in diesen Fällen jedoch eine Stärkung der noch verbleibenden Haare bewirken.

Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Packungsgrößen

90 und 300 Kapseln.

Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht geschützt aufbewahren.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Information d'emploi

pantogar®

Capsules

No d'enreg. 1-18177

Fabricant:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
D-60318 Frankfurt

Titulaire d'enregistrement:

Merz Consumer Care Austria GmbH,

1110 Wien, Guglgasse 17

Composition

1 capsule contient: 60 mg de D-pantothenate de calcium, 220 mg de L-cystine.

Excipients:

célulose, colorants (E171, E172), gélatine, stéarate de magnésium, povidone, silica, talc.

Propriétés et efficacité

Pantogar est une thérapeutique capillaire et unguéale à administration orale. Par la voie sanguine, Pantogar apporte aux cheveux et aux ongles les éléments constitutifs D-pantothenate de calcium et l'acide aminé L-cystine.

Pantogar déploie un effet bénéfique face aux différentes formes de chute diffuse de cheveux.

L'influence positive sur la croissance capillaire est appréciable au nombre de cheveux tombés spontanément autant qu'aux résultats de l'examen des racines capillaires. Pantogar améliore la structure capillaire, favorise la résistance des cheveux aux nuisances d'ordre mécanique, chimique et actinique et fortifie la chevelure. Sous traitement au Pantogar, il intervient une régression manifeste des troubles

de la croissance unguéale. La tendance aux ongles cassants diminue et leur élasticité se trouve rehaussée.

Indications

Chute diffuse de cheveux (chute d'étiologie non définie). Altérations dégénératives de la structure capillaire (cheveux fatigués, fins, raides, fragiles, cassants, flasques, sans éclat ni couleur), cheveux abîmés par des rayons solaires ou UV, prévention du grisonnement. Troubles de la croissance unguéale (ongles cassants, fendus et non élastiques).

Mode d'emploi

Avaler sans croquer avec un peu de liquide au cours des repas principaux.

Posologie

Sauf avis contraire, se conformer rigoureusement aux conseils de posologie: adultes 3 x 1 capsule par jour. Durée moyenne du traitement 3-6 mois. En cas de besoin, le traitement peut être prolongé ou répété.

Contre-indications

Aucun.

Pour des raisons de sécurité, il est judicieux de suspendre la prise de la préparation durant la grossesse et l'allaitement.

Effets secondaires, interactions, effets d'accoutumance

Aucun connu.

Avis particuliers pour l'usage correct

La formation du cheveu étant un processus lent, une prise régulière de Pantogar à la posologie prescrite durant une période de 3-6 mois est essentielle pour le succès du traitement.

Pantogar n'est pas indiqué en présence de chute de cheveux d'origine cicatricielle et lors d'alopécie androgénique ou normale (calvitie chez l'homme). Dans ces cas, l'effet de Pantogar se limite à la fortification des cheveux existants.

En cas de persistance des troubles ou lorsque le succès escompté n'intervient pas sous traitement, il est conseillé de solliciter l'avis du médecin.

Respecter la date de péremption.

Conserver hors de portée des enfants.

Emballages

90 et 300 capsules.

Avis de conservation

Ne pas conserver à plus de 25°C, à l'abri de la lumière.

Pour toute information supplémentaire, prière de solliciter l'avis du spécialiste.

Directions for use

pantogar®

Capsules

Reg. No. 1-18177

Manufacturer:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
D-60318 Frankfurt

Owner of registration:

Merz Consumer Care Austria GmbH,
1110 Wien, Guglgasse 17

Composition

1 capsule contains: calcium D-pantothenate 60 mg, L-cystine 220 mg.

Excipients:

cellulose, colorants (E171, E172), gelatin, magnesium stearate, povidone, silicon dioxide, talc.

Properties and efficacy

Pantogar is an oral therapeutic agent for hair and nails. Pantogar supplies hair and nails with the fortifying substances calcium D-pantothenate and L-cystine, an amino acid.

Pantogar has an advantageous effect in the case of various forms of diffuse hair loss. An improvement in hair growth is observed, both from the number of spontaneously lost hairs and by an examination of the hair roots. Pantogar improves the hair structure, increases the resistance of the hair to mechanical and chemical damage and damage caused by sunlight and strengthens the hairs. Nail growth disorders are greatly improved by treatment with Pantogar. The nails become less brittle and their elasticity increases.

Indications

Diffuse hair loss (hair loss for unknown reasons). Degenerative changes in the hair structure (stressed, thin, inelastic, brittle, lifeless, dull and colourless hair), hair damaged by sunlight and UV radiation, prevention of greying of the hair. Nail growth disorders (brittle, cracked and inelastic nails).

Method of use

Take at meal times with a little liquid, without chewing.

Dosage

Unless prescribed otherwise follow the dosage exactly: adults 1 capsule 3 times daily. Average duration of treatment 3-6 months. If necessary, the treatment can be continued or repeated.

Contraindications

None.

For safety reasons, the preparation should not be taken during pregnancy and lactation.

Adverse effects, interactions, dependences

None known.

Special warnings to ensure safe use

Since hair formation takes place slowly, it is important to take Pantogar regularly in the prescribed dose over a period of 3-6 months in order to ensure success in the treatment.

Pantogar is not indicated either for hair loss with scarring or for androgenetic or conventional alopecia (male baldness). In these cases, however, Pantogar can strengthen the remaining hair.

If the symptoms persist or if the expected success is not achieved through the use of the drug, you should consult your doctor.

Do not use after the expiry date.

Keep out of the reach of children.

Pack sizes

90 and 300 capsules.

Storage information

Do not store at above 25°C. Store away from light.

In the event of queries, obtain professional advice.



MN 38119 MC 1294

Gebrauchsinformation

pantogar®

Kapseln

Z.Nr. 1-18177

Hersteller:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
D-60318 Frankfurt

Zulassungsinhaber:

Merz Consumer Care Austria GmbH,
1110 Wien, Guglgasse 17

Zusammensetzung

1 Kapsel enthält: Calcium-D-pantothenat 60 mg,
L-Cystin 220 mg.

Hilfsstoffe:

Cellulose, Farbstoffe (E171, E172), gelatine,
Magnesiumstearat, povidone, silicon dioxide, talc.

Eigenschaften und Wirksamkeit

Pantogar ist ein Haar- und Nageltherapeutikum zum Einnehmen. Pantogar versorgt die Haare und Nägel über die Blutbahn mit den Aufbaustoffen Calcium-D-pantothenat und der Aminosäure L-Cystin. Pantogar zeigt eine günstige Wirkung bei verschiedenen Formen des diffusen Haarausfalls. Sowohl anhand der Anzahl spontan ausgefallener Haare als auch der Haarwurzeluntersuchung kann eine Haarwachstumsverbesserung beobachtet werden. Pantogar bewirkt eine Verbesserung der Haarstruktur, eine Erhöhung der Widerstandskraft des Haares gegenüber mechanischen, chemischen sowie Strahlenschäden und eine Stärkung der Haare. Nagelwachstumsstörungen erfahren durch die Pantogar-Behandlung eine starke Besserung. Die Brüchigkeit der Nägel nimmt ab, und die Elastizität nimmt zu.

Anwendungsgebiete

Diffuser Haarausfall (Haarausfall unklärbarer Ursache). Degenerative Veränderungen der Haarstruktur (strapaziertes, dünnes, unelastisches, sprödes, brüchiges, schlaffes, glanz- und farbloses Haar), durch Sonnen- und UV-Bestrahlung geschädigtes Haar, Vorbeugung gegen Ergrauen des Haares. Nagelwachstumsstörungen (brüchige, splitternde und unelastische Nägel).

Art der Anwendung

Zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten: Erwachsene 3x täglich 1 capsule. Mittlere Behandlungsdauer 3-6 Monate. Die Behandlung kann im Bedarfsfall fortgesetzt oder wiederholt werden.

Gegenanzeigen

Keine.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Einnahme des Präparates während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden.

Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekte

Keine bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Da sich die Haarbildung langsam vollzieht, ist eine regelmäßige Einnahme von Pantogar in der vorgeschriebenen Dosierung über einen Zeitraum von 3-6 Monaten wichtig, um Erfolge bei der Behandlung zu erzielen.

Pantogar ist weder bei narbigem Haarausfall noch bei der androgenetischen oder gewöhnlichen Alopezie (männliche Glatze) angezeigt. Pantogar kann in diesen Fällen jedoch eine Stärkung der noch verbleibenden Haare bewirken.

Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich. Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Packungsgrößen

90 und 300 Kapseln.

Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht geschützt aufbewahren.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Information d'emploi

pantogar®

Capsules

No d'enreg. 1-18177

Fabricant:

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
D-60318 Frankfurt

Titulaire d'enregistrement:

Merz Consumer Care Austria GmbH,

1110 Wien, Guglgasse 17

Composition

1 capsule contient: 60 mg de D-pantothenate de calcium, 220 mg de L-cystine.

Excipients:

célulose, colorants (E171, E172), gélatine, stéarate de magnésium, povidone, silica, talc.

Propriétés et efficacité

Pantogar est une thérapeutique capillaire et unguéale à administration orale. Par la voie sanguine, Pantogar apporte aux cheveux et aux ongles les éléments constitutifs D-pantothenate de calcium et l'acide aminé L-cystine.